



## أسراب كثيرة وكبيرة تشكل تهديداً غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل المعيشة في منطقة القرن الأفريقي

**تحديث 13 يناير 2020**

في القرن الأفريقي، حدثت زيادة كبيرة وخطيرة للغاية في نشاط أسراب الجراد خلال الأسبوع الماضي في كينيا، حيث تنتشر أسراب كبيرة غير ناضجة جنسيا من مناطق الغزو الأولية في الشمال الشرقي (مقاطعة مانديرا) جنوب واجير وجاريسا، وغربا على طول الحدود الإثيوبية (مقاطعات مويال ومارسابيت) وجنوب غرب المناطق الوسطى شمال جبل كينيا (إيسولو، سامبورو، ميرو، ومقاطعات لاكيييا مؤخرا). وبلغ طول سرب واحد غير ناضج جنسيا 60 كم وعرض 40 كم في الشمال الشرقي. من المتوقع حدوث المزيد من الاسراب في هذه المناطق، بعضها يتحرك بالفعل شمال جبل كينيا غرب الوادي المتصدع (مقاطعة بارينغو) حيث يمكن أن يستمر هذا إلى الشمال الغربي من مقاطعة توركانا، في حين أن البعض الآخر سوف يتحرك غربا على طول الحدود الإثيوبية، ويمكن أن تنتقل بعض الأسراب جنوبا إلى مقاطعة نهر تانا. وقد تصل بعض الأسراب إلى شمال شرق أوغندا وجنوب شرق جنوب السودان. في جميع المناطق، هناك تهديد غير مسبوق للأمن الغذائي وسبل المعيشة. في الشمال الشرقي، بدأت بعض الأسراب تنضج جنسيا، مما يعني أن وضع البيض قد يكون وشيكا في المناطق المفتوحة ذات التربة الرملية الرطبة حيث يفقس البيض بعد حوالي أسبوعين وينشأ عنه العديد من بقع الحوريات في شهر فبراير.


في إثيوبيا، لا تزال الأسراب الغير ناضجة جنسيا تتشكل وتتحرك في المناطق الشرقية من هرار (شرق هارغي) والصومالي (جيجيجا وواردر، كيريدهار، غودي في أوغادين). كما توجد أسراب غير ناضجة جنسيا أيضا جنوبا في أوروميا (بال) وفي الأيام الماضية على حافة وادي ريفت (بورينا) بالقرب من تيلتي ويابيلو. وقد بدأت بعض الأسراب تنضج جنسيا في منطقة جودي. ومن المتوقع ظهور المزيد من الأسراب في الأجزاء الجنوبية من أوروميا والمناطق الصومالية وفي المنطقة الجنوبية الغربية من SNNPR (اومو الجنوبية) جنوب أومو حيث من المحتمل أن تنضج جنسيا وتضع البيض.

في الصومال، توجد أسراب ناضجة جنسيا في منطقة جاربهاري بالقرب من مانديرا، كينيا.

هذا وتجري عمليات مكافحة أرضية وجوية محدودة في إثيوبيا حيث تمت مكافحة 3700 هكتار حتى الآن في يناير، وفي كينيا تمت المكافحة من قبل منظمة مكافحة الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا (DLCO-EA) والوكالات الوطنية والمحلية والقطاع الخاص. في وسط وجنوب الصومال بسبب انعدام الأمن لم يتم إجراء عمليات المسح والمكافحة حتى الآن. ويجب تحسين جهود المكافحة الجوية بشكل عاجل وسريع في جميع هذه الدول.

في جنوب غرب آسيا، لا تزال الأسراب موجودة على جانبي الحدود الهندية الباكستانية، إلا ان الاعداد آخذة في الانخفاض بسبب عمليات المكافحة والهجرة إلى جنوب إيران حيث نضجت الأسراب التي تصل بالفعل إلى الجنوب الشرقي ووضعت البيض. في الأيام القليلة الماضية، هطلت أمطار غزيرة بشكل غير عادي في جنوب شرق إيران، مما تسبب في فيضانات وخسائر في الأرواح. على الساحل الجنوبي الشرقي بالقرب من تشابهار، حيث هطلت أمطار في يوم ونصف بمعدلات أكثر مما كانت تسقط عادة خلال العام بأكمله. وبمجرد انحسار مياه الفيضانات، ستكون الظروف البيئية مواتية لعدة أشهر من التكاثر والذي من المتوقع أن يسبب زيادة كبيرة في أعداد الجراد بحلول الربيع.


هذا ويستمر التكاثر المهم في مناطق التكاثر الشتوية على طول السهول الساحلية للبحر الأحمر حيث تجري عمليات المكافحة ضد مجموعات الحوريات والبقع ومجموعات الحشرات الكاملة في المملكة العربية السعودية (8000 هكتار) وإريتريا (3500 هكتار) والسودان (1800 هكتار) واليمن (1080 هكتار) وعمان (1710 هكتار).



الوضع العام للجراد الصحراوي في كافة المناطق



تطور وضع الجراد في الصومال واثيوبيا من اغسطس الى 13 يناير



تطور وضع الجراد في كينيا من 28 ديسمبر 2019 الى 13 يناير 2020