


حالة الجراد الصحراوي

تحديث 14 أكتوبر 2020

حيث تتزايد أسراب الجراد الصحراوي وتتحرك في دول القرن الأفريقي

من المتوقع أن يتدهور الوضع مع بدء ظهور المزيد من الأسراب وبدء جيل آخر من التكاثر من ساحل **البحر الأحمر** إلى **الصومال**، والذي يمكن أن يستكمل بأسراب قادمة من **اليمن**. ومن المحتمل أن يهدد هذا **كينيا** حيث يمكن أن تصل أسراب الجراد إلى الشمال اعتبارا من منتصف نوفمبر فصاعدا. ومع ذلك، فإن الوضع أقل خطرا مما كان عليه قبل عام، والدول مستعدة بشكل أفضل.



حالة الجراد الصحراوي تحديث 14 أكتوبر 2020

- **أثيوبيا**، يتشكل المزيد من الأسراب غير الناضجة جنسيا في منطقة عفار في الشمال الشرقي على إمتداد الجانب الغربي من الوادي المتصدع. بينما تحركت أسراب قليلة إلى المناطق المجاورة لمرتفعات أمهرة وتيجراي، كما تحركت العديد من الأسراب جنوب شرق الوادي المتصدع إلى مرتفعات هرار وأسفل الجرف الشرقي باتجاه أوجادين في منطقة صومالي الاثيوبية. وعبرت بعض الأسراب إلى شمال غرب **الصومال**. وشوهد سرب واحد على الأقل يتكاثر في منطقة دولو في منطقة صومالي بالقرب من حدود الصومال مع اثيوبيا. ومن المتوقع أن تنتقل المزيد من الأسراب إلى منطقة صومالي الاثيوبية، بما في ذلك منطقة أوجادين حيث يمكن أن تنضج جنسيا وتضع البيض في مناطق ملائمة أو تتحرك جنوبا. ومازالت عمليات مكافحة الأرضية والجوية مستمرة.

- **الصومال**، شوهدت أسراب غير ناضجة جنسيا في الشمال الغربي في بداية شهر أكتوبر ويمكن أن يظهر المزيد منها في أي وقت. وفي الشمال الشرقي، نضجت الأسراب وتحرك بعضها جنوبا باتجاه جالكايو لوضع البيض. سيحدث الفقس وتشكيل بقع الحوريات، ومن المرجح أن يتحرك المزيد من الأسراب جنوبا إلى المناطق الوسطى. هذا وتستمر عمليات مكافحة باستخدام المبيدات الحيوية على وجه الخصوص.
- **كينيا**، تم استخدام المبيدات الحيوية الأسبوع الماضي لمكافحة سرب في مقاطعة لايبيا الشمالية. وتشير التقارير اللاحقة إلى أنه انقسم إلى عدة أسراب صغيرة. هذا وقد تبدأ أسراب جديدة في الوصول في شهري نوفمبر وديسمبر.
- **إريتريا**، فقد تواجدت مجموعات ويقع الحوريات في بعض المناطق الساحلية للبحر الأحمر من عيد في الجنوب إلى مهميمت في الشمال. وشوهد قيام مجموعات الحشرات الكاملة الناضجة جنسيا بوضع البيض بالقرب من مهميمت. وما زالت عمليات مكافحة الأرضية جارية. ومن المتوقع حدوث المزيد من التكاثر، مما يؤدي إلى تكون بقع الحوريات، ومجموعات الحشرات الكاملة غير الناضجة جنسيا، وربما عدد قليل من الأسراب.
- **السودان**، تشكل المزيد من مجموعات الحوريات من الفقس في شرق البلاد بين نهر عطبرة وتلال البحر الأحمر. وتتواجد الحشرات الكاملة الإنفرادية الناضجة جنسيا في الشمال الشرقي وعلى الساحل الجنوبي للبحر الأحمر بين دلتا طوكر والحدود الإريترية وقد يكون وضع البيض على وشك ان يبدأ. وما زالت عمليات مكافحة الجوية والأرضية مستمرة.
- **اليمن**، يستمر التكاثر في المناطق الداخلية حيث توجد مجموعات من الحوريات ومجموعات من الحشرات الكاملة الناضجة والغير ناضجة جنسيا والأسراب غير الناضجة جنسيا بشكل رئيسي بالقرب من الحزم وعلى الأرجح في أماكن أخرى أيضا. وشوهدت أسراب غير ناضجة جنسيا بالقرب من صنعاء، بينما تهاجر أسراب أخرى جنوبا باتجاه الساحل الجنوبي حيث من المحتمل ازدياد الأسراب. كما تواجدت مجموعات الحوريات في أعمار من متوسطة إلى متأخرة على الساحل الشمالي للبحر الأحمر بالقرب من سوق عيس والتي تشكل مجموعات حشرات كاملة حديثة التجنح غير ناضجة جنسيا. وهناك عمليات مكافحة ميدانية جارية ولكنها تواجه عقبات كثيرة بسبب انعدام الأمن.
- **السعودية**، تتواجد مجموعات الحوريات في الاعمار المتأخرة بشكل رئيسي في السهول الساحلية الجنوبية للبحر الأحمر شمال جيزان. وقد بدأ الفقس وتقوم الحشرات الكاملة الغير ناضجة جنسيا بتشكيل مجموعات الجراد. وتستمر عمليات مكافحة الأرضية في تلك المواقع.
- **غرب إفريقيا وجنوب غرب آسيا**، يعتبر الوضع هادئ حالياً.