




حالة الجراد الصحراوي تحديث 26 أكتوبر 2020

الجرد الصحراوي يُشكل جيلاً جديداً في القرن الإفريقي

كما هو متوقع، لا يزال الوضع حرجاً للغاية مع تشكيل المزيد من الأسراب وبدء جيل جديد من التكاثر في **إثيوبيا والصومال**، مما سيؤدي إلى تكون أسراب جديدة بحلول منتصف ديسمبر والتي من المحتمل أن تتحرك جنوباً وتهدد **كينيا**. وعلى الرغم من أن الدول مستعدة بشكل أفضل مقارنة بالعام الماضي، إلا أن عمليات المسح والمكافحة تحتاج إلى الاستمرار من أجل رصد وتقليل أكبر عدد ممكن من الإصابات. إضافة إلى تزايد أعداد الجراد على جانبي جنوب **البحر الأحمر**.



توقعات الجراد الصحراوي من أكتوبر حتى ديسمبر 2020

موقع الجراد الصحراوي تحديث 26 أكتوبر 2020

وفي التفاصيل:

- **إثيوبيا**: تواجد أسراب عديدة على إمتداد الحواف الغربية والشرقية للوادي المتتصدع الشمالي في مناطق عفار وصومالي. بينما انتقلت بعض الأسراب إلى مرتفعات تيغراي وأمهرة، وتتحرك معظم الأسراب جنوباً إلى الوادي المتتصدع إلى أصيلة، وشرقاً إلى مرتفعات هرار وما بعدها إلى أوجادين وديجه بور. وقد بدأ جيل جديد من التكاثر في الجزء الشرقي الأقصى من منطقة صومالي حيث يحدث الفقس وتشكل بقع الحوريات. وسيحدث المزيد من عمليات وضع البيض والفقس وتشكل بقع الحوريات في هذه المنطقة خلال شهر نوفمبر. وما زالت عمليات المكافحة الجوية والأرضية مستمرة.

- **الصومال**: تواجد أسراب غير ناضجة وناضجة جنسياً في الشمال الغربي بين بوروما وهرجيسا بينما تواجد مجموعات حشرات كاملة وأسراب ناضجة جنسياً في الشمال الشرقي وفي المناطق الوسطى من مودوج وجالجودود.

وقد بدأ الفقس وتشكل بقع الحوريات في الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع حدوث المزيد في الأسابيع القادمة، بما في ذلك المنطقة الشمالية الغربية بمجرد حدوث وضع البيض. وعلى الرغم من أن الأسراب الحالية لا تزال شمالاً وبين ونهر شبييلي، إلا أن هناك تقارير غير مؤكدة عن وجود الجراد في الجنوب. وما زالت عمليات المكافحة الجوية والأرضية مستمرة بالمبادرات الحيوية.

- **كينيا**، لا يزال هناك عدد قليل من الأسراب الصغيرة الناضجة جنسياً في مقاطعة سامبورو، ويمكن أن يحدث تكاثر محلي في النهاية في الشمال الغربي مع هطول الأمطار في مدة قصيرة. وهناك خطر ضئيل يتمثل في أن بعض الأسراب الموجودة حالياً في إثيوبيا قد تصلك إلى الشمال الشرقي في منتصف نوفمبر تقريباً بينما من المرجح أن يصل الجيل التالي من الأسراب التي تتشكل في شرق إثيوبيا ووسط الصومال من منتصف ديسمبر فصاعداً.
- **إريتريا**، وصلت مؤخراً أسراب عديدة غير ناضجة جنسياً من شمال شرق إثيوبيا إلى المرتفعات جنوب أسمرة حيث من المحتمل أن تستمر إلى ساحل البحر الأحمر. ومجموعات الحوريات لا تزال موجودة في السهول الساحلية في وسط ساحل البحر الأحمر بالقرب من شعيب حيث سقطت الأمطار في وقت سابق من هذا الشهر. ويجري حالياً الفقس وتقوم الحشرات الكاملة غير الناضجة جنسياً بتشكيل المجموعات، وما زالت عمليات المكافحة الأرضية جارية.
- **السودان**، حدث الفقس وتشكل المزيد من مجموعات الحوريات في الشرق بين نهر عطبرة وتلال البحر الأحمر. وكانت بعض الحوريات تنسليخ الانسلاخ الأخير وتشكل مجموعات من الحشرات الكاملة غير الناضجة جنسياً. كما تواجدت بقع الحوريات ومجموعات الحشرات الكاملة غير الناضجة جنسياً في دلتا طوكر على ساحل البحر الأحمر. وقد شكلت الحشرات الكاملة الانفرادية مجموعات قليلة في مناطق التكاثر الصيفي الداخلية، وما زالت عمليات المكافحة الأرضية والجوية جارية.
- **اليمن**، يستمر التكاثر على الساحل الشمالي للبحر الأحمر بالقرب من الزهرة حيث تتوارد بقع الحوريات في الأعمار المتأخرة وتشكل مجموعات حشرات كاملة غير ناضجة جنسياً. كما تواجدت الحشرات الكاملة الناضجة جنسياً على وسط الساحل بالقرب من الحديدة. وقد انتقلت أسراب التكاثر الصيفي من المناطق الداخلية إلى المرتفعات بالقرب من صنعاء وأب والضالع حيث كانت مستقرة في السهول الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن. ومن المحتمل وجود عدد قليل من مجموعات الحشرات الكاملة والأسراب غير الناضجة جنسياً في المناطق الداخلية حيث ستهاجر إلى المناطق الساحلية. وسيستمر التكاثر على ساحل البحر الأحمر ولكنه أقل احتمالاً على ساحل خليج عدن بسبب الظروف الجافة. وهناك عمليات المكافحة جارية.
- **السعودية**، تستمر عمليات المكافحة على ساحل البحر الأحمر ضد مجموعات الحوريات بالقرب من الليث ومجموعات الحشرات الكاملة غير الناضجة جنسياً شمال جيزان. ومن المتوقع أن يستمر التكاثر، وما زالت عمليات المكافحة الأرضية جارية.
- **مناطق غرب إفريقيا وجنوب غرب آسيا**، لا توجد تطورات ولا يزال الوضع هادئاً.