


حالة الجراد الصحراوي  
تحديث 26 يناير 2021  
أسراب الجراد الصحراوي تظهر في جنوب غرب السعودية من اليمن



موقف الجراد الصحراوي، تحديث 26 يناير 2021

في الأسبوع الماضي، وصلت عدة أسراب للجراد الصحراوي غير ناضجة جنسيا على ساحل البحر الأحمر وجبال عسير جنوب غرب السعودية. من المحتمل أن تكون هذه الأسراب قد نشأت من المناطق الساحلية والمرتفعات المجاورة في شمال اليمن التي لا يمكن الوصول إليها بأمان. عمليات مكافحة واسعة المدى جارية ضد مجموعات الحوريات في الاعمار المبكرة والمتوسطة على ساحل البحر الأحمر في السعودية من جيزان إلى الوجه.

وفي اليمن، توجد حشرات كاملة مشتتة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن التي لم تتطلب المكافحة حتى الآن.

في منطقة القرن الأفريقي، يستمر وصول وانتشار الأسراب غير الناضجة جنسيا في جميع أنحاء شمال ووسط كينيا. وفي اليومين الماضيين، تم الإبلاغ عن أسراب في 10 مقاطعات (واجير، غاريسا، نهر تانا، إيسيلو، مارسابيت، سامبورو، لاكيبيبا، ميرو نورث، ميرو سنترال، وتاراك). حتى الآن، بدأت أسراب قليلة فقط في النضج الجنسي. أما في الجنوب الشرقي، حدث الانسلاخ الأخير للحوريات بالقرب من تابتا تافيتا وكان هناك عدد قليل من بقع الحوريات في الاعمار المتأخرة على إمتداد الساحل.

وفي **إثيوبيا**، انتقلت الأسراب غير الناضجة جنسيا إلى منطقتي عفار وأمهرة الشرقية بينما استمرت أسراب أخرى غير ناضجة جنسيا في الوجود وتنتشر في أجزاء من مناطق أوروميا و SNPP. ولا تزال أسراب الجراد غير الناضجة جنسيا موجودة جنوب جيجيجا ولا يزال عدد قليل منها في أجزاء من شرق منطقة صومالي حيث تجف الظروف البيئية. وهناك خطر من أن تستمر أسراب قليلة في التحرك من عفار إلى أمهرة وتيجراي وربما تصل إلى ساحل البحر الأحمر في **إريتريا** و**السعودية**. سوف تنضج الأسراب جنسيا قريبا وتبدأ في وضع البيض بشكل رئيسي في مناطق أوروميا و SNPP.

أما في **الصومال**، تتواجد مجموعات وبقع الحوريات على الساحل الشمالي الغربي وفي الشمال الشرقي حيث لا يزال وضع البيض مستمرا. وظلت بعض الأسراب في مناطق وسطية (مدج، جلجدود) حيث تكون ناضجة وقد تتكاثر في أي مكان مناسب. وتوجد أسراب غير ناضجة جنسيا في الجنوب حيث تواصل الانتقال إلى **كينيا**.

مع استمرار جفاف الظروف البيئية في بعض أجزاء جنوب وشمال **إثيوبيا** وشمال وسط **كينيا**، من المرجح أن تنتشر الأسراب بحثا عن مناطق ملائمة لتنضج جنسيا وتضع البيض إذا ما سقطت الأمطار في الأسابيع المقبلة. سيؤدي هذا إلى ظهور بقع الحوريات في شهري فبراير ومارس. عمليات المكافحة الجوية والأرضية المكثفة جارية لتقليل الأسراب الحالية بحيث يكون حجم التكاثر القادم أقل.

هذا ويستمر التكاثر على إمتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر على جانبي الحدود بين **إريتريا** و**السودان** حيث تقوم الفرق بمكافحة بقع ومجموعات الحوريات. كما يجري تكاثر مماثل في وادي الدثيب في شمال شرق **السودان**.